



U.F. OTORINOLARINGOIATRIA

Responsabile:

Dott. Carmelo Federico

Collaboratori

Dott.ssa Claudia Arcarese

Dott.ssa Antonella Ballacchino

Dott. Alessio Fallica

Dott. Salvatore Grasso

Dott. Alessandro Marino

Dott.ssa Rita Micalef

Dott. Antonio Naso

Attività Chirurgica

- Chirurgia dell'orecchio
- Chirurgia funzionale naso-sinusale
- Chirurgia della parotide e delle ghiandole salivari
- Chirurgia della Tiroide
- Chirurgia delle corde vocali
- Chirurgia del faringe

Attività Ambulatoriali

- Visita specialistica
- Rinolaringofibroscopia
- Esame audiometrico tonale
- Esame audiometrico vocale
- Esame impedenzometrico
- Studio della Deglutizione
- Prove Vestibolari

Ambulatorio Disturbi del Sonno e Apnee Notturme

Dott.ssa Antonella Ballacchino

Ambulatorio Logopedia

Dott.ssa Egle Sciuto

Contatti

095 5879010

348 2417075

ISTRUZIONI POST-OPERATORE DOPO INTERVENTO DI MIRINGOTOMIA ED INSERZIONE DI DRENAGGIO TRANS-TIMPANICO

Questo foglio d'istruzioni è stato compilato per aiutarla a risolvere alcuni problemi o dubbi che le possono capitare nelle prime settimane dopo l'intervento al quale è stato sottoposto.

Controlli medici:

- Il primo controllo in genere avviene dopo 1 settimana, i successivi saranno fissati di volta in volta dallo Specialista.
- Dopo circa 6 mesi sarà valutata la possibilità di rimozione del drenaggio trans-timpanico.

Accorgimenti comportamentali:

- **Non far entrare acqua nell'orecchio** per tutto il tempo (in genere 6 mesi) in cui permangono i drenaggi transtimpanici.
- Evitare affaticamento fisico nei primi 4 giorni dopo l'operazione.
- Chiudere i condotti uditivi con tappi aurocolari durante la doccia e il bagno.
- Continuare con gli esercizi di ginnastica nasale quando prescritti.

È considerato normale:

- Avere fastidi all'orecchio soprattutto alla deglutizione nei primi 7 giorni.
- Una fuoriuscita di una goccia di sangue dall'orecchio.

Avvertenze generiche:

- **Dieta:** Non ci sono limitazioni quantitative.
- **Scuola / Lavoro:** Si può riprendere la normale frequenza dopo 2 giorni dall'intervento.