



U.F. OTORINOLARINGOIATRIA

Responsabile:

Dott. Carmelo Federico

Collaboratori

Dott.ssa Claudia Arcarese

Dott.ssa Antonella Ballacchino

Dott. Alessio Fallica

Dott. Salvatore Grasso

Dott. Alessandro Marino

Dott.ssa Rita Micalef

Dott. Antonio Naso

Attività Chirurgica

- Chirurgia dell'orecchio
- Chirurgia funzionale naso-sinusale
- Chirurgia della parotide e delle ghiandole salivari
- Chirurgia della Tiroide
- Chirurgia delle corde vocali
- Chirurgia del faringe

Attività Ambulatoriali

- Visita specialistica
- Rinolaringofibroscopia
- Esame audiometrico tonale
- Esame audiometrico vocale
- Esame impedenzometrico
- Studio della Deglutizione
- Prove Vestibolari

Ambulatorio Disturbi del Sonno e Apnee Notturme

Dott.ssa Antonella Ballacchino

Ambulatorio Logopedia

Dott.ssa Egle Sciuto

Contatti

095 5879010

348 2417075

ISTRUZIONI POST-OPERATORE DOPO INTERVENTO DI MICROLARINGOSCOPIA

Questo foglio d'istruzioni è stato compilato per aiutarla a risolvere alcuni problemi o dubbi che le possono capitare nelle prime settimane dopo l'intervento al quale è stato sottoposto.

Controlli medici:

- Il controllo postoperatorio in genere avviene dopo circa 1 settimana dall'intervento; il programma dei controlli successivi verrà indicato dallo specialista.
- Se ritenuto opportuno dallo specialista in occasione della visita di controllo, potrebbe risultare necessario effettuare il ciclo di Logopedia al fine di migliorare ed accelerare la ripresa della sua voce.
- Riceverà la fotocopia dell'esame istologico definitivo; la stessa può essere anticipata telefonicamente dopo circa 15 giorni dall'intervento.

È considerato normale:

- Dolenzie delle zone posteriore del collo ed all'arcata dentaria possono essere presenti per circa 7 giorni dopo l'intervento.

Accorgimenti comportamentali:

- **Qualunque sia stata l'indicazione alla Microlaringoscopia il fumo è assolutamente vietato a permanenza.**

Avvertenze generiche:

- **Dieta:** Può riprendere da subito la sua normale dieta.
- **Attività fisica:** Per 2 giorni evitare attività fisiche impegnative e/o sportive.
- **Scuola / Lavoro:** Si può riprendere la normale frequenza dopo 2 giorni dall'intervento.