



## U.F. OTORINOLARINGOIATRIA

### Responsabile:

Dott. Carmelo Federico

### Collaboratori

Dott.ssa Claudia Arcarese

Dott.ssa Antonella Ballacchino

Dott. Alessio Fallica

Dott. Salvatore Grasso

Dott. Alessandro Marino

Dott.ssa Rita Micalef

Dott. Antonio Naso

### Attività Chirurgica

- Chirurgia dell'orecchio
- Chirurgia funzionale naso-sinusale
- Chirurgia della parotide e delle ghiandole salivari
- Chirurgia della Tiroide
- Chirurgia delle corde vocali
- Chirurgia del faringe

### Attività Ambulatoriali

- Visita specialistica
- Rinolaringofibroscopia
- Esame audiometrico tonale
- Esame audiometrico vocale
- Esame impedenzometrico
- Studio della Deglutizione
- Prove Vestibolari

### Ambulatorio Disturbi del Sonno e Apnee Notturne

Dott.ssa Antonella Ballacchino

### Ambulatorio Logopedia

Dott.ssa Egle Sciuto

### Contatti

095 5879010

348 2417075

## ISTRUZIONI POST-OPERATORE DOPO INTERVENTO DI SCIALOADENECTOMIA SOTTOMANDIBOLARE

Questo foglio d'istruzioni è stato compilato per aiutarla a risolvere alcuni problemi o dubbi che le possono capitare nelle prime settimane dopo l'intervento al quale è stato sottoposto.

### Controlli medici:

- L'esame istologico definitivo le verrà consegnato non appena pronto (circa 10 giorni dopo l'intervento).
- Tra circa 7 giorni dovrà eseguire una visita di controllo durante la quale le sarà rimossa la medicazione ed i punti di sutura. Fino ad allora sarebbe utile che tale medicazione non venisse rimossa.
- Ulteriori controlli saranno necessari per verificare la corretta guarigione.

### È considerato normale:

- Il gonfiore nella sede d'intervento è normale e durerà circa 8 giorni.
- Potrebbe avere un modesto sanguinamento nella sede dell'intervento e/o un rialzo termico intorno ai 37.5°C. Il tutto scompare entro 2 – 3 giorni.
- Il labbro del lato operato potrebbe perdere la sensibilità per circa due (2) mesi.
- **Se dovesse insorgere paralisi faciale avvertire immediatamente il medico.**

### Accorgimenti comportamentali:

- **Non fare entrare ASSOLUTAMENTE acqua o altro nella ferita.**
- Non assumere farmaci anticoagulanti come aspirina o altri antinfiammatori, potrebbero essere responsabili di emorragie. Per eventuale dolore preferire paracetamolo (Tachipirina, Acetamol, etc.)
- È sconsigliato guidare l'auto per almeno 48 ore dopo l'intervento.

### Avvertenze generiche:

- **Dieta:** Può riprendere da subito la sua normale dieta.
- **Attività fisica:** Per quattro (4) settimane evitare attività fisiche stressanti e/o sportive.
- **Scuola / Lavoro:** In genere sono sufficienti 2 settimane di riposo.