



U.F. OTORINOLARINGOIATRIA

Responsabile:

Dott. Carmelo Federico

Collaboratori

Dott.ssa Claudia Arcarese

Dott. Salvatore Grasso

Dott. Alessandro Marino

Dott. Aldo Torrìsi

Attività Chirurgica

- Chirurgia dell'orecchio
- Chirurgia funzionale naso-sinusale
- Chirurgia della parotide e delle ghiandole salivari
- Chirurgia della Tiroide
- Chirurgia delle corde vocali
- Chirurgia del faringe

Attività Ambulatoriali

- Visita specialistica
- Rinolaringofibroscopia
- Esame audiometrico tonale
- Esame audiometrico vocale
- Esame impedenzometrico
- Studio della Deglutizione
- Prove Vestibolari

Ambulatorio Disturbi del Sonno e Apnee

Notturme

Dott. Marco Fragale

Ambulatorio Logopedia

Dott.ssa Egle Sciuto

Contatti

095 5879010

348 2417075

ISTRUZIONI POST-OPERATORE DOPO INTERVENTO DI TIMPANOPLASTICA

Questo foglio d'istruzioni è stato compilato per aiutarla a risolvere alcuni problemi o dubbi che le possono capitare nelle prime settimane dopo l'intervento al quale è stato sottoposto.

Controlli medici:

- Tra circa 7 giorni dovrà eseguire una visita di controllo durante la quale le sarà rimossa la medicazione ed i punti di sutura. Fino ad allora sarebbe utile che tale medicazione non venisse rimossa.
- Ulteriori controlli saranno necessari per verificare la corretta riepitelizzazione del timpano.

È considerato normale:

- Un certo senso di instabilità è normale subito dopo l'intervento e può durare qualche giorno
- Potrebbe avere un modesto sanguinamento nella sede dell'intervento e/o un rialzo termico intorno ai 37.5°C. Il tutto scompare entro 2 – 3 giorni.
- Il condotto uditivo esterno è stato riempito con materiale gelatinoso, per tale motivo è normale avvertire la sensazione di orecchio pieno e rumore.

Accorgimenti comportamentali:

- **Non fare entrare ASSOLUTAMENTE acqua o altro nell'orecchio operato per circa 3 mesi.**
L'acqua potrebbe favorire l'insorgenza di complicanze infettive.
- Non assumere farmaci anticoagulanti come aspirina o altri antinfiammatori, potrebbero essere responsabili di emorragie. Per eventuale dolore preferire Paracetamolo (Tachipirina, Acetamol etc.)
- Nel caso di insorgenza di **raffreddore** effettuare una terapia decongestionante:
 - Actifed CPR: 1 CPR ogni 12 ore per 6 giorni salvo controindicazioni specifiche.
- Evitare di soffiare il naso.
- **Se dovesse starnutire, lo faccia a bocca aperta per i primi 20 giorni.**
- È sconsigliato guidare l'auto per almeno 48 ore dopo l'intervento.
- **Si sconsiglia di viaggiare in aereo per il 1° mese dopo l'intervento**

Avvertenze generiche:

- **Dieta:** Può riprendere da subito la sua normale dieta.
- **Attività fisica:** Per quattro (4) settimane evitare attività fisiche stressanti e/o sportive.
- **Scuola / Lavoro:** In genere sono sufficienti 2 settimane di riposo.